

# Alcaudón común

*Lanius senator*

Woodchat Shrike

## Clasificación taxonómica:

- Orden: Passeriformes
- Familia: Laniidae
- Género: Lanius

## Datos biométricos:

- Longitud: 17-19 cm.
- Envergadura: 25-30 cm.
- Peso: 25-40 gr.



## Introducción:

El alcaudón es un paseriforme muy propio del arco mediterráneo, es un ave propia de los paisajes abiertos con arbolado y matorrales dispersos, por lo que podremos encontrarlos en el olivar del parque. A pesar de tratarse de un ave relativamente común en numerosas regiones, sus poblaciones han experimentado durante las últimas décadas un cierto declive, como consecuencia de las transformaciones sufridas en el medio rural.

## Características físicas:



Adulto

Se caracteriza por su voluminosa cabeza, teñida en su parte superior de rojo parduzco, y por su manto negro, con amplias manchas blancas en las alas. En la cara tienen un antifaz negro que va desde la frente y avanza englobando al ojo hacia atrás y luego un poco hacia abajo describiendo una curva, además tienen una estrecha línea negra perpendicular al antifaz en la parte central de la frente. Las alas son de color negro pero con las coberteras primarias y las escapulares de color blanco. La cola larga y estrecha es también de color negro, excepto en los bordes y en la base. Las patas son cortas y son de color negro. En vuelo, con las alas y la

cola desplegadas, muestra un bello diseño blanco y negro. A larga distancia y posado se reconoce muy bien por el notable contraste entre los colores oscuros de las partes superiores y el color blanco marfil de su garganta, pecho y vientre. De cerca se puede apreciar el ancho, corto y ganchudo pico



Juvenil

negro, más propio de una pequeña rapaz que de un pájaro. Los ojos son grandes, de color negro y tienen alrededor un fino anillo periocular blanquecino. Durante la época reproductiva les aparecen unas manchas blanquecinas no muy largas por detrás del ojo. Los jóvenes por la parte superior son de color pardo, excepto el obispillo que es de color marrón rojizo y carecen de la máscara que tienen los adultos. Los alcaudones comunes jóvenes poseen una distintiva mancha clara en la base de las



plumas primarias. Existe dimorfismo sexual en esta especie, aunque no es muy acentuado. Los machos por la parte superior son de color negro y las hembras en general son más apagadas, de color pardo en vez de negro.



#### **Etología (comportamiento animal):**

Se trata de un ave poco sociable y tímido. Suele estar posado en ramas altas de arbustos, vallas y muros, siempre que estén elevados, desde donde otea y se lanza para cazar insectos y pequeños reptiles. El macho se acantona rápidamente en un territorio que defiende con valentía, dónde se realizará la puesta. En cuanto al canto lo emiten cuando se siente amenazado o quiere intimidar a un intruso, realizan unos chasquidos ásperos, muy seguidos y rápidos (chart-chart-chart), que recuerdan a los proferidos por las urracas.

#### **Alimentación:**

Habitualmente consume insectos, sobre todo escarabajos. Completa su dieta con otros artrópodos, pequeños mamíferos como roedores y reptiles. Empala algunas de sus presas en arbustos espinosos, aunque con menos frecuencia que el alcaudón real.

#### **Reproducción:**

La época de reproducción se inicia entre los meses de Abril y Mayo, poco después de llegar a los territorios de cría y se extiende hasta Junio. De hecho, se piensa que los alcaudones comunes ya vienen emparejados de sus zonas de invernada.

El macho es el que decide la ubicación del nido, le gusta ubicarlo en arbustos espinosos y arbolillos densos. La hembra, con ayuda del macho, construye el nido con forma de tazón. Emplea ramas muy finas y flexibles, tallos herbáceos, musgo e incluso telas de araña. Tapiza el interior con pelo, lana y plumas. Aunque generalmente realizan una sola puesta anual,



ocasionalmente pueden ser dos. La puesta consta de cinco a seis huevos, que son de colores variados, pueden tener un tono verdoso, blancuzco o rosado y siempre con motas oscuras, que muchas veces forman un anillo en el polo más ancho.



Durante la incubación, que transcurre en poco más de dos semanas, la hembra es alimentada por el macho. Después, tras la eclosión, ambos padres ceban a los pollos a lo largo de tres semanas. Las crías abandonan el nido a los 21 días de edad. Los adultos abandonan sus lugares de cría a mediados de julio para regresar a sus cuarteles de invierno, y a partir de esta fecha los individuos que veremos serán juveniles en migración.

### Hábitat:

Los hábitats preferentes de esta ave son ambientes de monte bajo, arbóreo, estepario y de marisma. Le gustan las dehesas, claros próximos a los bosques, campos de cultivo como olivares y en general terrenos con vegetación baja, matorrales y pocos y dispersos árboles. Es un ave típica de paisajes mediterráneos abiertos, con arbolado y matorral disperso. También se instala en matorrales con abundante cobertura. Igualmente ocupa sotos fluviales, olivares, almendrales, pastizales y llanuras cerealistas.

### Presencia y abundancia:

Su presencia máxima en la zona es desde Febrero a Septiembre; mínima en Octubre cuando vuelven a migrar a África, dónde hibernan durante los meses de Noviembre a Enero, meses en los que está ausente en nuestra zona. En épocas de presencia es abundante y fácilmente observable.




### Desplazamientos y fenología:

En España son habituales durante el período estival, llegan procedentes de África en Febrero-Marzo y permanecen hasta Septiembre. Todas las poblaciones europeas y norteafricanas migran y cruzan el Sáhara tras el periodo reproductor. Invernan en las sabanas africanas y en Arabia Saudí. A la Península llegan en el mes de marzo, y se marchan durante el verano y a principios del otoño.

### Distribución geográfica y población:


Teniendo en cuenta todas las subespecies, el rango de distribución, comprende la mayoría de los países europeos y africanos del entorno de la cuenca mediterránea, así como los territorios asiáticos situados entre Turquía y el mar Caspio. Están presentes en el Sur de Europa, en el Suroeste de Asia y en África Central. En España durante la primavera aparece en casi toda la península. No obstante, se trata de un ave rara en las regiones norteñas más húmedas.



La población europea se estima entre 440.000 y 1,1 millones de parejas reproductoras. El contingente español estaría integrado por 390.000-860.000 parejas (Atlas de las aves reproductoras de España, 2003). En las últimas décadas se registra a escala europea una dramática reducción del área ocupada y un consecuente descenso poblacional, sobre todo en las regiones más alejadas del arco mediterráneo. En España también se constata una importante tendencia negativa, especialmente en las regiones más húmedas.

### Grado de amenaza:

Especie no amenazada. En Europa, está catalogada como LC (preocupación menor) en la Lista Roja de la UICN. Sin embargo, por el Libro Rojo de las aves de España (2004), está catalogada como “Casi amenazada” y está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Las poblaciones europeas, y por extensión, las españolas han sufrido los cambios en las prácticas agrarias. Por un lado, el abandono de la ganadería en régimen extensivo ha provocado la pérdida de pastizales, que se han cubierto de matorral. Por otro lado, la modernización de las explotaciones agrarias ha conllevado la pérdida de alimento como consecuencia del empleo abusivo de plaguicidas. A su vez, es un ave que, como tantas otras migradoras, también se ve afectada por los cambios de uso que se están produciendo en los territorios de invernada en África. Aquí padece, además, la presión cinegética y las fuertes sequías.



### Curiosidades y Anécdotas:

Aunque mayormente se alimentan de insectos, pequeños roedores, reptiles o anfibios, también lo hace de pequeños pájaros y sus crías. Permanece al acecho de su presa, a la que atrae imitando su canto. Esta especie tiene la curiosa costumbre de empalar a sus presas en las largas espigas de algunas plantas e incluso en las púas de las alambradas metálicas, para utilizarlas como despensa y también como ayuda para desgarrar a sus presas. Es común



verlos posados en un posadero como puede ser la ramita más alta de un árbol o de un matorral o un cardo aislado o una estaca desde los que se lanza a capturar sus presas. Otros nombres con los que se conoce a esta especie son: acardibón, alcarabuzón, alcauzón, cabecigordo, cabehona entre otros.