

Alcaudón real meridional

Lanius meridionalis

Great Grey Shrike

Clasificación taxonómica:

- Orden: Passeriformes
- Familia: Laniidae
- Género: Lanius

Datos biométricos:



- Longitud: 22-26 cm.
- Envergadura: 28-35 cm.
- Peso: 40-60 gr.

Introducción:

El alcaudón real es el de mayor tamaño de los alcaudones ibéricos. Podría decirse que tiene un pico más propio de una rapaz, pero posee patas de pájaro. Es sedentario y frecuente en ambientes abiertos con vegetación baja y matorrales, podrá encontrarse en la zona repoblada del Parque Olivar del Zaudín. Suele observarse en solitario posado en cables, postes o partes altas de arbustos, oteando en busca de insectos, pequeños mamíferos y reptiles, a los que empala en arbustos espinosos.

Características físicas:

A simple vista destaca la corpulencia y larga cola de este ave. Tiene una cabeza muy voluminosa, en la que llama la atención su ancho antifaz negro que va desde el pico hacia atrás englobando al ojo. Por encima del antifaz tienen una estrecha ceja blanca que se inicia en la base del pico y que sobrepasa un poco por detrás al ojo. La garganta y las mejillas justo debajo del antifaz son de color blanco. Por la parte superior del cuerpo tiene la cabeza y el dorso de color gris plumizo. En cambio, el pecho y el vientre poseen un color blanco-rosado. Las alas son negras, con una distintiva mancha blanca. La cola es larga y estrecha, por la parte superior es de color negro en la zona central y de color blanco en los laterales mientras que por la parte inferior es toda de color blanco. Tiene un pico robusto y corto, ganchudo en la punta y de color negro. Sus grandes ojos, también de color negro, tienen alrededor un fino anillo peri-ocular negruzco. No hay dimorfismo sexual en esta especie. El alcaudón real se parece mucho a los alcaudones chico y norteño. Pese a ello, los adultos de alcaudón real son más grandes que los de alcaudón chico. Por otra parte, la pechuga rosada del alcaudón real permite distinguirlo del alcaudón norteño que es blanca.



Etología (comportamiento animal):

Se trata de una especie poco sociable, que podremos ver durante gran parte del tiempo posada en cables, ramas altas y postes al acecho de sus presas, adoptando una postura erguida y moviendo su larga cola hacia arriba y abajo. Al igual que otros alcaudones, suele empalar a sus presas sobrantes en las espinas de los arbustos, llegando a formar auténticas despensas. En su canto emite notas muy diversas, metálicas, sonoras y bastante potentes. Además reproduce trinos y gorjeos de fringílicos y aláudidos.



Alimentación:

Se alimenta de grandes insectos como escarabajos, saltamontes y grillos, pequeños mamíferos como ratones y topillos, pequeños pájaros y sus crías, reptiles y ocasionalmente carroña. Como ya hemos dicho anteriormente genera despensas empalando sus presas en las ramas punzantes de arbustos espinosos. También utilizan esta técnica para despedazar a sus presas más grandes. Caza al acecho, oteando desde un posadero dominante, en posiciones altas como postes, cables o ramas altas de arbustos.

Reproducción:



El periodo de reproducción es desde Febrero a Mayo. En general en España la época de reproducción suele comenzar en Marzo y en los territorios más cálido, como es el caso de nuestra zona, se inicia antes. Puede sacar adelante hasta tres polladas, aunque normalmente solo tienen una puesta anual. Construyen el nido en arbolillos o en arbustos densos, habitualmente pinchudos. Lo suelen construir siempre en el mismo árbol o arbusto y lo hacen a base de ramas, hierbas secas y musgo y forrándolo después con plumas. La puesta se compone de cinco a siete huevos de color blanco verdoso y con motas oscuras. Los pollos nacen tras 15-19 días de incubación, son alimentados por ambos padres, y en menos de tres semanas abandonan el nido.



Hábitat:

Los hábitats preferentes de esta ave son ambientes de monte bajo y arbóreo. El alcaudón real suele localizarse en zonas abiertas de dehesa y bosques laxos, con vegetación baja, matorrales y pocos árboles y arbustos dispersos. Se puede ver en áreas cultivadas y en los sotos fluviales. Durante el invierno frecuenta las zonas de matorral y las llanuras con matas diseminadas. Casi siempre por debajo de los 1.500 metros de altitud.

Presencia y abundancia:

Tiene una presencia máxima durante todo el año en nuestra zona. En los periodos de presencia es abundante y fácilmente observable. En el Aljarafe-Doñana, el alcaudón real es una especie abundante como reproductora.




- Presencia máxima
- Presencia escasa
- Nidificación

Desplazamientos:

Es una especie sedentaria pero hay una minoría de individuos invernantes que comienzan a aparecer desde finales de agosto, permaneciendo con nosotros hasta principios del mes de abril. Los ejemplares invernantes cruzan el estrecho de Gibraltar en agosto y septiembre. Los individuos sedentarios realizan movimientos dispersivos fuera de la época de cría. En la Península existen zonas donde macho y hembra se mantienen juntos en el territorio de cría, mientras que en otras las hembras se dispersan.

Distribución geográfica y Población:


Se reconocen diferentes subespecies, que se extienden por tres continentes: Europa, África y Asia. En Europa, el alcaudón real es muy escaso y se restringe al sur de Francia, Portugal y España. En España son residentes habituales. La subespecie



meridionalis coloniza toda España, salvo la vertiente norteña de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. En la zona del Aljarafe-Doñana, el alcaudón real es una especie abundante como reproductora. La población del suroeste de Europa se estima entre 212.000 y 353.500 parejas reproductoras. Gran parte de este contingente estaría en España, donde vivirían de 200.000 a 250.000 parejas en territorio peninsular. De acuerdo con los datos obtenidos en 2013 por el programa SACRE, la tendencia padece un fuerte declive en los últimos años. La reducción se data entre un 20-70% de la población.

Grado de amenaza:

Especie no amenazada en el entorno de Doñana y Aljarafe. Está catalogada como LC (preocupación menor), en la Lista Roja Europea de la UICN. Sin embargo en el Libro Rojo de las aves de España (2004), figura como especie "Casi amenazada" por su declive en la mitad norte de España. La intensificación de las explotaciones resulta sumamente perjudicial para aves insectívoras y carnívoras como los alcaudones. El empleo abusivo de plaguicidas disminuye la cantidad de insectos y pequeños mamíferos, además de provocar el envenenamiento de las aves, con su consecuente infertilidad o muerte. Asimismo, con la agricultura moderna se reduce la diversidad de ambientes donde emplazar el nido o buscar comida. Por otro lado,



también le afecta negativamente el proceso opuesto, ya que el abandono de las prácticas agrarias se traduce en una rápida matorralización, lo que limita igualmente la disponibilidad de insectos y otros pequeños animales.

Curiosidades y Anécdotas:

Al igual que el alcaudón común esta especie tiene la curiosa costumbre de empalar a sus presas en las largas espinas de algunas plantas para utilizarlas como despensa y también como ayuda para desgarrar a sus presas. Pueden imitar el canto de algunas aves para utilizarlo como reclamo para así atraerlas y poder darles caza. Hasta el año 2005 el Alcaudón real meridional (*Lanius meridionalis*) y el Alcaudón norteño (*Lanius excubitor*) eran considerados como subespecies de la especie que hasta entonces se llamaba Alcaudón real, por tanto el Alcaudón real meridional se conocía como la Subespecie *meridionalis* y el Alcaudón norteño era denominado como Subespecie *excubitor*. Otros nombres con los que se conoce a esta especie son: alcaudón sureño, arcudón carnicero, picapuerco, rabipego y verdugo entre otros. El Alcaudón norteño, se parecen mucho al meridional pero se diferencia en que este por la parte superior es más oscuro y tienen tintes parduzcos, además por la parte inferior tienen tintes grises en vez de rosáceos. El Alcaudón chico, se distingue porque tiene un tamaño menor y en que su antifaz es más ancho.

