

## Andarrío chico

### **Actitis hypoleucos**

Common sandpiper



#### **Clasificación taxonómica:**

- Orden :*Charadriiformes*
- Familia: *Scolopacidae*
- Género: *Actitis*

#### **Datos biométricos:**

- Longitud :18-20 cm.
- Envergadura: 40 cm.
- Peso: 40-80 gr.

#### **Introducción al ave:**

El Andarrío Chico es un ave que podemos ver fácilmente en el Parque del Zaudín ya que se adapta a los requerimientos ambientales específicos del arroyo. Es una de nuestras escasas limícolas reproductoras, aunque se trata de una especie no muy común que además, manifiesta unos requerimientos muy específicos, pues precisa para instalarse de la presencia de ríos y arroyos de montaña con abundantes guijarros, gravas y orillas arenosas.

#### **Características físicas:**

Por la parte superior son de color pardo oscuro con algunos tintes dorados. En la zona superior del pecho tienen una especie de babero redondeado por su parte inferior que es de color pardo claro con un rayado vertical de color marrón oscuro; este babero tiene entre él y el ala una franja blanca que sube hacia arriba bordeando el hombro por delante. Por la parte inferior son de color blanco. No existe dimorfismo sexual en esta especie. En la cara tienen una ceja blanca medianamente ancha que va desde el



pico hasta más atrás del ojo y por delante del ojo una brida de color marrón oscuro. El pico es corto, delgado y recto aunque algunos ejemplares lo tienen ligeramente curvado hacia abajo; es de color pardo grisáceo y es algo más oscuro en su extremo. Los ojos son grandes, son de color marrón oscuro y están bordeados por un anillo periocular de color blanco. La garganta es

blanquecina. La cola es corta y estrecha y cuando está en reposo sobrepasa las alas. Las alas están arqueadas, son oscuras por la parte superior y tienen una franja blanca en la parte posterior. Las patas son cortas y son de color amarillo verdoso pálido. Los jóvenes tienen unas franjas claras en las plumas coberteras y un punteado en el borde de las plumas terciarias.

### **Etología:**

En vuelo, el andarríos chico exhibe un diseño alar característico, con una ancha franja blanca enmarcada por plumas más oscuras. El andarríos chico presenta un vuelo muy típico, sobrevolando a poca altura el agua, alternando aletazos más o menos espasmódicos con planeos cortos, manteniendo las alas arqueadas. Una vez en tierra, acostumbra a agitar la cabeza y la cola de arriba abajo. El macho emite un “tu tu fi fi tu tu fi fi” sibilante, rápido y continuo. La especie también produce un silbido semejante a un “fit fit fit fiiii”.



### **Alimentación:**

Su dieta se compone de gusanos, moluscos, insectos, arácnidos, crustáceos, renacuajos y alguna materia vegetal. Durante el invierno los andarríos chicos emplean una gran parte del día en la búsqueda de alimento, registrándose valores superiores a los empleados en la época reproductora y los pasos migratorios. El Andarríos Chico captura sus presas visualmente mediante picoteo.



### **Reproducción:**

La nidificación suele ser durante los meses de abril y mayo el nido es construido principalmente por la hembra, se ubica en el suelo, no muy lejos del agua, y consiste en una suave depresión tapizada con materia vegetal y piedras. Anidan en las orillas de los ríos, especialmente si éstas están compuestas de piedras y cantos. Aprovechan alguna depresión La puesta tiene lugar a fines de abril o principios de mayo consta normalmente de cuatro huevos de color beis o crema con motas y estrías pardas o rojizas. La incubación se prolonga 21 o 22 días y la llevan a cabo ambos



sexos. Los pollos reciben los cuidados de los dos adultos aunque se alimentan solos y se desarrollan en unos 26-28 días. Las crías son nidífugas, a las pocas horas de nacer abandonan el nido. La reproducción se realiza en Abril-Junio.



**Hábitat:**


En la Península cría de forma muy dispersa por ríos, arroyos y embalses, donde ocupa ensenadas, bancos arenosos y acumulaciones de grava. Durante la migración si suele formar bandos algo más numerosos, desplazándose al anochecer volando a buena altura. Fuera de la época de cría muestra marcada preferencia por zonas húmedas abarcando multitud de hábitats tanto costeros como de interior. Evita los espacios abiertos y demasiado expuestos. Así, durante los pasos migratorios y el invierno se le puede observar en llanuras intermareales, playas, zonas rocosas, estuarios, marismas y diversos hábitats relacionados con cauces de agua dulce. Es frecuente verlo en ríos, riachuelos, acequias, canales y balsas de riego, lagos, charcas, arrozales, lagunas, y embalses. También se le puede observar en hábitats antropogénicos como bordes de carreteras y caminos, jardines urbanos, puertos, etc. Durante la reproducción es más exigente escogiendo cursos de agua en buen estado de conservación y en los que las molestias son mínimas.

**Presencia y abundancia:**

La presencia máxima de esta especie en nuestra zona se da desde agosto a mayo, presencia mínima en junio y julio. Es abundante y fácilmente observable en los periodos de presencia.

**Desplazamientos:**

Es una especie residente en la Península, aunque también resulta común no tanto como en la invernada en los pasos migratorios. Es posible que algunos efectivos ibéricos se comporten como migradores y se desplacen hacia el sur fuera de la



- Presencia máxima
- Presencia escasa
- Nidificación

estación reproductora. La Península y Baleares acogen durante la migración aves originarias de Europa occidental, cuyo paso pos nupcial se observa principalmente en agosto. Los efectivos europeos abandonan sus lugares de cría generalmente a lo largo de julio y alcanzan sus áreas de invernada en África en agosto y septiembre. En España una parte de la población es residente todo el año pero otra parte emigra a África. En invierno desde Noviembre hasta Febrero su número es escaso pero

en verano su número aumenta debido a la presencia de aves procedentes de Europa. Durante la primavera y el otoño también aumenta su número coincidiendo con los pasos de los emigrantes europeos.

**Distribución geográfica y población:**


Como reproductor, el andarríos chico se extiende por gran parte de Eurasia, aunque se hace más raro y de distribución fragmentada hacia el sur. Parte de la población migra e inverna en el sur de Europa, Asia meridional, África y Oceanía. No presenta subespecies. Es un ave poco común, que resulta más frecuente en la mitad norte y en zonas de cierta altitud, mientras que falta o es muy escasa en amplias áreas del sur y Levante.



Su patrón de distribución se asocia a la presencia de ríos y embalses y solo parece común en las estribaciones de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. También se presenta en las cuencas altas y medias de los ríos Miño, Duero, Tajo y Guadiana, y especialmente en el Ebro y sus afluentes. No se encuentra como reproductor en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En invernada, la población está muy dispersa, pero tiende a ocupar enclaves propicios de Andalucía atlántica, Galicia y Asturias.

**Grado de amenaza:**

Especie no amenazada pero dispone de protección especial. Las molestias humanas fundamentalmente como consecuencia de la pesca deportiva, el turismo y el senderismo, y la alteración y destrucción del hábitat fluvial “acondicionamiento” de riberas, construcciones de mini centrales hidroeléctricas, extracción de áridos, etc. Son los principales problemas para la conservación de la especie. El andarríos chico se incluye en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



**Curiosidades y Anécdotas:**

El andarrío chico presenta un vuelo muy típico, sobrevolando a poca altura el agua, alternando aletazos más o menos espasmódicos con planeos cortos, manteniendo las alas arqueadas. Cuando están en tierra mueven constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo y también realizan un movimiento oscilatorio con la cabeza. También llamados: andarrío mazaricu, andarrío pequeño, andarríos, cascajera y cimblarraos.

