

# Curruca cabecinegra

## *Sylvia melanocephala*

Sardinian Warbler

### Clasificación taxonómica:

- Orden: Passeriformes
- Familia: Sylviidae
- Género: Sylvia

### Datos biométricos:

- Longitud: 13-14 cm.
- Envergadura alar: 15-18 cm.
- Peso: 10-14 gr.



### Introducción:

Pequeña ave, que presenta un oscuro capirote que se extiende por debajo del ojo y contrasta intensamente con la garganta blanquecina, y el llamativo anillo ocular rojo, constituyen los principales rasgos distintivos de esta vistosa curruca. Frecuenta muchas formaciones de matorral mediterráneo del Parque Olivar del Zaudín, donde también podremos buscarlo en las ramas de los olivos del antiguo olivar. La especie se encuentra en expansión, quizá por estar beneficiándose del abandono del campo y de la invasión del matorral.

### Características físicas:

Pequeña ave de capirote oscuro, que llega hasta debajo del ojo. Existe dimorfismo sexual en esta especie. Los machos presentan partes superiores de color grisáceo oscuro, en contraste con las inferiores, más pálidas y blanquecinas. En la cabeza tienen un gran capirote negro que ocupa la frente, el píleo (parte superior de la cabeza) y la nuca. Las plumas del píleo se pueden erizar pero no llegan a constituir una cresta. La garganta es blanca. Los ojos también están incluidos en el capirote, estos son pequeños, de color castaño y están rodeados por un anillo peri-ocular de color rojo, ambos sexos lo presentan. Las hembras son más parduzcas en el dorso, con zonas ventrales de color pardo pálido y cabeza grisácea. El capirote de estas no resulta tan notorio como el de los machos. Los jóvenes se parecen a las hembras pero su coloración es más apagada. Las patas son medianamente largas y de color pardo anaranjado. El pico es fino y puntiagudo, de color negro con la base de la mandíbula inferior más clara. La cola es larga y es de color gris negruzco con las rectrices (plumas) externas blancas.





### Etología (comportamiento animal):

Su vuelo es generalmente inquieto, moviéndose nerviosa entre la vegetación arbustiva, asomándose a veces sobre ésta. Son aves de costumbres bastante inquietas y suelen ser muy desconfiadas, por lo que son muy territoriales y suelen estar solas o en pareja. Tienen un canto muy sonoro, constituido por una sucesión de estrofas cortas, traqueteantes y rápidas, con notas ásperas y estridentes. El reclamo, conformado por un repetitivo tre-tre-tre, tra-tra-tra, resulta muy característico.

### Alimentación:

Su alimentación se basa principalmente en la captura de insectos. Durante el periodo otoñal y el invierno consume fundamentalmente frutos silvestres, sobre todo de arbustos mediterráneos, como del lentisco y también de los acebuches.



### Reproducción:

Su época de reproducción y cría se extiende de marzo a junio, con posibilidad de que realice dos puestas anuales y ocasionalmente tres. Ambos padres participan en la construcción del nido, generalmente sobre matorjos o arbustos densos. Se trata de un pequeño cuenco de hojas y ramitas, tapizado de hojas secas y hierbas, pelusas y plumas. La puesta consta de tres a seis huevos, de color pardo a rosado y finamente moteados, los cuales son incubados durante 13 días por ambos parentales. Los pollos, a los que también cuidan y alimentan ambos progenitores a lo largo de 12 o 13 días, alcanzan la independencia dos o tres semanas más tarde.



### Hábitat:

Sus hábitats preferentes son de Monte bajo, Arbóreo y Estepario. Son muy sensibles a los fríos intensos. Ocupa los sectores más térmicos y secos, en zonas donde abunda el matorral mediterráneo espeso de porte mediano (acebuchares y lentiscas). También se encuentra en dehesas, pinares y bosques de ribera con denso sotobosque arbustivo, así como en setos y jardines. Su hábitat preferido son los matorrales de espino.

### Presencia y abundancia:

Tienen una presencia máxima durante todo el año ya que son residentes habituales. Es abundante y fácilmente observable. Aunque aquí es una especie abundante escasea en la Meseta norte, en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Es más abundante en la mitad sur meridional ya que es sensible a las olas de frío. En zonas más septentrionales, durante los años de frío intenso suelen producirse mortandades importantes, aunque sus poblaciones tienen una buena capacidad de recuperación.




- Presencia máxima
- Presencia escasa
- Nidificación

### Desplazamientos:

En España son residentes habituales. La mayor parte de las poblaciones ibéricas son sedentarias. Sin embargo, se han descrito movimientos en invierno hacia localidades del sur peninsular y el norte de África que quizás impliquen a jóvenes en dispersión, aunque se desconoce la amplitud de dichos desplazamientos. En el sur de España se detectan incrementos numéricos durante los meses de septiembre a noviembre, correspondientes al movimiento de aves jóvenes en esa época posnupcial.

### Distribución geográfica y población:




En España está ampliamente distribuida por la mitad sur peninsular, Baleares y Canarias, esta curruca también penetra por el valle del Ebro hasta el País Vasco y el noreste de Castilla y León. Se encuentra ausente o es muy escasa en la Meseta norte, la Cordillera Cantábrica, Pirineos, el

Sistema Ibérico y Asturias. Como especie reproductora se distribuye por todos los países circunmediterráneos, en el sur de Europa, desde la Península Ibérica hasta Turquía y por el noroeste de África, desde Marruecos hasta Libia. La población española no se conoce bien, pero sin duda supone varios cientos de miles de parejas, e incluso puede que supere el millón. Durante las últimas décadas, esta especie ha experimentado una expansión distributiva y poblacional clara hacia el centro y el norte peninsular, que prosigue en la actualidad. La población europea se ha estimado en 2,2-5,8 millones de parejas, con los principales efectivos en España, Portugal, Grecia e Italia.

### Grado de amenaza:

Especie no amenazada. Se trata de una especie no amenazada tanto en España como en el resto de Europa, está catalogada como LC (Least Concern) según la Lista Roja de la UICN. Esta especie parece hallarse en aumento en las últimas décadas, quizás por la expansión del matorral como consecuencia del abandono del campo. Esta curruca resulta muy sensible a las olas de frío, que podrían condicionar su distribución en las primaveras siguientes. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas la incluye en la categoría "De interés especial".



### Curiosidades y Anécdotas:

Las curruacas como ya hemos dicho anteriormente durante el otoño e invierno pueden alimentarse de frutos de pequeño tamaño de los matorrales. Las zarzamoras por ejemplo son consumidas por estas aves, especializadas en seleccionar el tamaño de la drupeola (fruto), y de la semilla que contiene, más ajustado a las dimensiones de su pico. Otros nombres que recibe son: aceitunero (por su tendencia a alimentarse del fruto de los acebuches), cabecita negra (por su capirote negro), carbonera morisca, ojeroso, ratilla de ojos malos (por el color rojizo de sus ojos y del anillo periocular). Por su aspecto físico se parece mucho a la Curruca mirlona, sin embargo esta no presenta el ojo ni el anillo periocular de color rojo, y las patas las tiene de color grisáceo.