

# Garceta real

## *Ardea cinerea*

Grey heron

### Clasificación taxonómica:

- Orden: Ciconiiformes
- Familia: Ardeidae
- Género: Ardea

### Datos biométricos:

- Longitud: 85-100 cm.
- Envergadura alar: 160-180 cm.
- Peso: 1400-2000 gr.



### Introducción:

La Garza real es un ave de gran tamaño y aspecto inconfundible, no es muy numerosa como nidificante en la Península Ibérica, aunque se encuentra en expansión. Es, en cambio, mucho más abundante durante la invernada y los pasos migratorios, cuando muchos ejemplares europeos paran en nuestro territorio a descansar y alimentarse de camino hacia el continente africano. Es en este momento cuando podremos ver a la Garza real en el Parque Olivar del Zaudín, ya que es un paso migratorio de esta. Resulta fácil observar a estas garzas, tanto en vuelo como posadas en las orillas de ríos y embalses aguardando el paso de alguna presa, que capturarán con la ayuda de su potente pico.

### Características físicas:

La garza real es un ave de gran tamaño, la mayor de las ardeidas que frecuentan nuestro país. Tiene una figura estilizada gracias a su largo cuello y patas, la coloración general del plumaje es grisácea, con un diseño variable según la edad y la época del año. Posee un pico en forma de puñal y muy largo. Las partes superiores y la cola son grises, que contrastan con las plumas rémiges negras, que son las plumas de vuelo duras y de forma asimétrica, ubicadas en la parte inferior de las alas. También contrasta con la gran mancha negra del hombro. La parte inferior del ave y el cuello son de color blanco. Durante el periodo reproductor, la cabeza de los adultos luce una coloración blanca y aparece adornada con una banda



ocular negra que termina en un largo penacho también negro con un par de largas plumas negras. El cuello, blanco también, se halla surcado

longitudinalmente por dos bandas paralelas negras. El largo y afilado pico presenta un tono rojizo, y las regiones dorsales son mayoritariamente cenicientas, con una llamativa mancha negra en los hombros. Fuera de la época de cría, el diseño es menos contrastado, sin las plumas ornamentales de la cabeza y con el pico amarillento.

### **Etología (comportamiento animal):**

En vuelo adopta la postura característica de las garzas, con el cuello encogido en forma de "S" y las patas estiradas sobresaliendo por detrás de la cola, si bien la garza real resulta fácilmente diferenciable del resto de sus parientes debido a su gran tamaño. Es muy típico de ellas el permanecer posadas sobre una sola pata durante largos períodos de tiempo. Tienen un ritualizado cortejo de reproducción, en el que



dominan las contracciones del cuello y son frecuentes las vocalizaciones. Además de producir diferentes vocalizaciones, fundamentalmente cuando se encuentra en compañía de otras garzas dentro de las colonias de cría, emite un sonido muy característico, como un a aarj, áspero y muy sonoro.

### **Alimentación:**



Se alimenta fundamentalmente de peces, en general, de buen tamaño. Sin embargo, el carácter oportunista de esta garza la lleva a incluir en su dieta una gran variedad de vertebrados (anfibios, reptiles, pollos de otras aves o pequeños mamíferos), crustáceos, moluscos, lombrices, grandes insectos e, incluso, materia vegetal. La técnica más habitual de caza que utiliza consiste en permanecer inmóvil, al acecho,

junto al agua, hasta que pasa alguna de sus posibles presas; una vez localizada, tras un fulminante movimiento del cuello, la pinza con el pico para luego deglutirla.

### **Reproducción:**



El periodo de reproducción es de Marzo a Junio. Durante la época de cría, la garza real muestra un carácter muy gregario y nidifica en colonias a las que se unen otras especies de garzas o, incluso, cigüeñas. Cría colonialmente en lugares cercanos a las masas de agua, casi siempre en los que haya presentes árboles grandes. No obstante, también pueden instalarla en juncos aplastados o en acantilados. Los

emplazamientos más habituales para estas agrupaciones, en las que reina una total algarabía, son los pequeños sotos ribereños, así como los bosquetes próximos a algún humedal. A mediados de febrero, cuando ya lucen el plumaje nupcial, macho y hembra acuden a la colonia y comienzan la reconstrucción del nido que utilizaron en pasadas temporadas con el necesario aporte de palos y ramas.

Tras el ritualizado cortejo, en el que dominan las contracciones del cuello y son frecuentes las vocalizaciones, la pareja concluye la plataforma, que tapiza con hierbas y hojas; en ella



deposita la hembra de tres a cinco huevos de color verde o azul pálido, que son incubados por ambos adultos durante 25-28 días, generalmente desde la puesta del primero. Los pollos son capaces de desplazarse por las inmediaciones del nido a los pocos días de nacer, aunque seguirán dependiendo durante un tiempo del alimento que les aportan sus progenitores. Al cabo de 45-55 días, con el plumaje completamente desarrollado, las jóvenes garzas ya son capaces de volar.

#### **Hábitat:**

Los hábitats preferentes son el Lacustre y Marisma. En la época de reproducción, esta garza frecuenta lagunas, marismas o riberas de agua dulce, siempre que cuenten con vegetación emergente y arbolado próximo en el que instalar sus nidos. Durante el invierno y en los pasos migratorios se muestra muy poco exigente y es habitual que ocupe todo tipo de humedales, naturales o artificiales (arrozales, salinas, canales de riego o balsas de piscifactorías), así como pastizales, prados o playas.



- Presencia máxima
- Presencia escasa
- Nidificación

#### **Presencia y abundancia:**

En nuestra zona la presencia máxima se da en los meses de otoño e invierno cuando están de paso migratorio hacia África. En los meses de presencia es fácilmente observable por su gran tamaño. No es muy numerosa como nidificante en la Península Ibérica. Es mucho más abundante durante la invernada y los pasos migratorios, cuando muchos ejemplares europeos paran en nuestro territorio a descansar y alimentarse de camino hacia el continente africano.

#### **Desplazamientos:**

Las poblaciones más norteñas de la especie son las únicas que realizan migraciones de largo alcance hacia latitudes más cálidas, en tanto que el resto de los reproductores europeos se consideran sedentarios o, a lo sumo, efectúan movimientos de escasa amplitud. En sus desplazamientos, escogen la Península Ibérica como principal lugar de destino o de paso obligado hacia África. Consecuentemente, en el estrecho de Gibraltar se detecta todos los años entre los meses de octubre y noviembre un importantísimo flujo migratorio de estas aves. Por lo que respecta a los individuos ibéricos, estos pueden realizar movimientos dispersivos para dirigirse tanto a otros países de Europa como hacia el continente africano.



obligado hacia África. Consecuentemente, en el estrecho de Gibraltar se detecta todos los años entre los meses de octubre y noviembre un importantísimo flujo migratorio de estas aves. Por lo que respecta a los individuos ibéricos, estos pueden realizar movimientos dispersivos para dirigirse tanto a otros países de Europa como hacia el continente africano.

#### **Distribución geográfica y población:**

Se trata de la mayor y más difundida de todas las garzas en el Oeste y Centro de Europa, no siendo así en la Península Ibérica, aunque también está muy extendida. La especie se encuentra ampliamente distribuida por todo el Paleártico, donde la subespecie cinerea cría en la mayor parte de Europa, Asia y África, incluido Madagascar. Inverna, asimismo, en

numerosas regiones europeas, África y el sur de Asia. En España, la garza real no es un ave demasiado habitual como reproductora, se concentra especialmente en las cuencas de los grandes ríos (Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir). También está presente en el delta del




Ebro y la albufera de Valencia, así como, en pequeños núcleos, en otras localidades catalanas y levantinas y en el sureste peninsular. Durante la invernada, la presencia de esta garza en territorio español aumenta

notablemente. La población europea se estima en 210.000-290.000 parejas. En España, que cuenta con 5.000-6.000 parejas, la tendencia poblacional resulta positiva y en claro proceso de expansión; en determinadas regiones españolas, como por ejemplo, Doñana, el número de efectivos ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Durante el año 2000, en Doñana concretamente en la pajarera de la Fuente del Duque se superaron por vez primera la cifra máxima de 1.200 parejas reproductoras.

**Grado de amenaza:**

Es una especie No Amenazada. Está catalogada como Least Concern (LC) en la Lista Roja de la UICN. Los principales problemas para la especie están relacionados con las fluctuaciones de los niveles hídricos de los humedales, la escasez de lugares de nidificación y la potencial persecución directa por parte de pescadores. La garza real se incluye en la categoría “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.



**Curiosidades y Anécdotas:**

La garza real es un ave de gran tamaño, la mayor de las ardeidas. Al igual que otras garzas cuando vuelan lo hacen con el cuello retraído lo que les diferencia de las espátulas, cigüeñas, grullas y avetoros que lo hacen con el cuello estirado. La mortalidad de los ejemplares jóvenes es muy elevada, puede llegar a alcanzar hasta el 70% durante los seis primeros meses de su vida. Son tan voraces que a veces quieren tragarse presas tan excesivamente grandes que les resulta imposible hacerlo y acaban regurgitándolas. Un ave relacionada por su canto y por su aspecto físico es la Garza imperial.

