

Pardillo común

Carduelis cannabina

Common linnet

Clasificación taxonómica:

- Orden: *Passeriformes*
- Familia: *Fringillidae*
- Género: *Carduelis*

Datos biométricos:

- Longitud: 13 cm.
- Envergadura: 25 cm.
- Peso: 20 gr.



Introducción al ave:

Ave pequeña y gregaria, y bastante abundante en nuestro parque y también en una gran variedad de hábitats. Aunque es algo difícil de reconocer por su coloración invernal, resulta en cambio, muy fácil de detectar por su reclamo en vuelo o por el llamativo color carmín de los machos en primavera. Habita en ambientes abiertos, donde se mezcla con otras aves consumidoras de semillas (granívoras).

Características físicas:

La cara es de color grisáceo-parduzco con una franja curvada blanquecina que bordea al ojo por su parte superior y otra por la parte inferior; en la zona de las mejillas tienen una pequeña mancha blanquecina. Los ojos son pequeños y de color marrón muy oscuro. El pico es muy corto, pequeño, grueso y cónico; es de color cuerno-grisáceo. La garganta es blanquecina con estrías oscuras; ese color blanquecino se continúa débilmente por la base del cuello, en su zona lateral, a modo de un pálido collar incompleto ya que no abarca la nuca. El píleo es de color grisáceo-parduzco pero durante la primavera y el verano les aparece en su parte anterior una mancha de un color rojo-escarlata muy intenso y brillante que se continúa por la frente. Las alas son de color castaño-rojizo con una franja alar blanco que se corresponde con



una franja longitudinal blanca que tienen las plumas primarias, las cuales son de color pardo-



negruzco; las plumas secundarias también son de color pardo-negruzco. La cola es larga, está ahorquillada y es de color de color pardo-negruzco con los bordes de las rectrices externas de color blanco. Existe ligero dimorfismo sexual en esta especie. Los machos por la parte superior tienen el plumaje de color castaño-rojizo y ligeramente estriado. Por la parte inferior son de color ocráceo-blancuecino con unos tintes rosáceo-rojizos pálidos en el pecho, excepto en

su parte central inferior; durante la primavera y el verano esos tonos rosáceo rojizos pálidos se vuelven de un color rojo escarlata muy intenso, brillante y llamativo. Las hembras por la parte superior son de color pardo con estrías marrones oscuras.

Por la parte inferior son de color ocráceo-blancuecino con bastantes estrías marrones oscuras en el pecho y en los flancos. No tienen los tintes de color rojo-escarlata que lucen los machos durante la primavera y el verano en el pecho y en la parte anterior del píleo y la frente.

Los jóvenes se parecen a las hembras pero su coloración es más pálida y sus estrías son menos numerosas, menos gruesas y están menos marcadas.

El pardillo es un pájaro estilizado, delgado, de pico corto y con cola larga y escotada. Su plumaje tiene color pardo en el dorso y ocre muy pálido en los flancos y el vientre. Presenta pintas alargadas o estrías, mucho más abundantes y visibles en las hembras. Además, los machos resultan inconfundibles en primavera, pues lucen un llamativo color carmín en la frente y el pecho. En vuelo ambos sexos y los jóvenes del año muestran una débil pero perceptible mancha blanca, que destaca sobre el color negruzco de sus alas.



Asimismo, el par de plumas externo de la cola es de color blanco. La costumbre de los pardillos de buscar el alimento en el suelo los diferencia de los escribanos, a los que se observa habitualmente posado en ramas de arbustos. Los escribanos, son, además, de talla mayor y menos gregaria que los pardillos. Fuera de la época reproductora, el pardillo

común se mueve en grandes bandos, que muchas veces son mixtos, pues se mezcla con otros fringílicos, como verdecillos, jilgueros, verderones comunes, lúganos, etc.

Etología:

En vuelo emite un relamo muy característico, compuesto por dos notas “chii-chie”, que repite con insistencia. El canto de los machos, mucho más elaborado, combina chirridos y gorgojos que pueden recordar a algunas notas del verderón común.

Alimentación:

Consume semillas pequeñas, que busca en el suelo. También captura insectos, sobre todo durante la primavera y el verano, para alimentar a los pollos.

Reproducción:

Suele criar en pareja, pero hay machos que copulan con más de una hembra. No es muy territorial, pues en ocasiones varias parejas instalan los nidos con pocos metros de separación. Inicia la primera puesta en los meses de abril y mayo, pero en las áreas más cálidas puede comenzar mucho antes. En sentido opuesto, en territorios montanos, por encima del límite forestal, retrasa el inicio de la reproducción. La hembra construye un nido que emplaza en arbustos densos. En la primera puesta suele elegir plantas perennes, pero en las siguientes escoge también arbustos caducifolios que ya hayan desarrollado sus hojas. Pone de cuatro a seis huevos, de color blanco azulado y con moteado rojizo o púrpura en su polo más ancho, y los incuba durante 10-14 días. Los pollos, nada más nacer, son empollados por la hembra y alimentados por el macho. Abandonan el nido dos semanas después.



Hábitat:

Esta ave prefiere los paisajes abiertos, ya sean costeros, mesetarios o montanos. Así, es común observarla en llanuras cerealistas, olivares, sabinares, dehesas muy abiertas de encinas, etc. También resulta común en los matorrales que reemplazan a los bosques degradados (jarales, retamares, tojares), siempre y cuando haya espacios abiertos con herbáceas. Además cría con éxito en piornales y brezales por encima del límite forestal, en las montañas atlánticas y mediterráneas. En invierno, el pardillo común se



congrega allí donde abunden las herbáceas que le aportan alimento en forma de semillas. Conformar grandes bandos en los cultivos de secano de ambas Mesetas y de las depresiones de los grandes ríos. Explora barbechos y bordes de caminos acompañado de otras especies, como jilgueros, verderones comunes, pinzones,



- Presencia máxima
- Presencia escasa
- Nidificación

verdecillos y lúganos. Los hábitats preferentes de esta ave son ambientes de monte alto monte bajo marisma y ribera.

Presencia y abundancia:

Escaso y difícilmente observable. Presencia máxima durante todo el año.

Desplazamientos:

Las poblaciones europeas son migradoras parciales. Así, las que crían en las latitudes más septentrionales se desplazan hacia el entorno mediterráneo tras el periodo reproductor. En la Península Ibérica, las poblaciones que crían en zonas frías, montanas, se desplazan a zonas



bajas y pasan el invierno en las depresiones de los grandes ríos (Tajo, Ebro, Guadalquivir, etc.) y en el litoral mediterráneo, incluyendo Baleares. En estos territorios se mezclan con pardillos europeos procedentes de Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Italia, Polonia, países bálticos, etc. Su llegada a la Península se detecta en los meses de septiembre y octubre. Algunos ejemplares se quedan a invernar y otros, junto con efectivos ibéricos, cruzan al norte de África. Posteriormente, en marzo y abril, retornan a Europa.

Distribución geográfica y población:

Es un ave ampliamente extendida por Eurasia, para la que se han descrito varias subespecies. Habita en gran parte de Europa, salvo en la mitad norte de Escandinavia y en la región más septentrional de Rusia. Por el este llega hasta China, y hacia el sur aparece en Israel, el noroeste de África y en las islas Canaria.




Se encuentra por toda la Península y está presente en todas las islas de los archipiélagos de Canarias y Baleares. En la Península se admite únicamente la subespecie *cannabina*, aunque también se ha citado la subespecie mediterránea. Por otra parte, para Canarias se reconocen las subespecies *dewaldoi* y *harterti*.

Grado de amenaza:

No amenazada. En España está catalogado como LC (Least Concern) preocupación menor en la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Como otras

aves, sufre la lacra de la caza por pajareros, de modo que miles de ejemplares mueren o son enjaulados cada año. Padece también los efectos de la intensificación y nuevas tecnologías de la agricultura. Se ha enrarecido allí donde se han implantado regadíos y donde se emplean herbicidas y plaguicidas.



Curiosidades y anécdotas:

Algunos machos practican la poligamia. Es habitual durante la primavera ver a los machos cantando posados en lo alto de una rama. Suelen andar por el suelo en busca de alimento. Son unas aves gregarias que pueden criar en colonias no excesivamente grandes. Pasada la época reproductiva van en bandos que suelen mezclarse con los verderones, lúganos, jilgueros y verdicillos. Son apreciados por su canto por ello esta especie sigue siendo víctima de la caza ilegal y de la autorizada. Los plaguicidas y los herbicidas están afectando seriamente a esta especie.